Тесты профессиональной переподготовке по специальности «Сестринское дело»

1. Сестринский процесс:
1. Сокращает время работы сестринского персонала
2. **Документирует качество предоставляемой помощи**
3. Приводит к освобождению вспомогательного персонала
4. Контролирует течение болезни

2. Парентеральным путем передаются гепатиты типа:
1. А и Е
2. С и Е
3. А и В
4. **В и С**

3. ВИЧ инфекция передается:
1. Парентеральным, контактным, от матери к плоду
2. **Парентеральным, от матери к плоду, половым**
3. Половым, парентеральным, контактным
4. Парентеральным, трансмиссивным, половым

4. При постановке очистительной клизмы опорожняется:
1. **Только прямая кишка**
2. Нижний отдел тонкого кишечника
3. Весь толстый кишечник
4. Нижний отдел толстого кишечника

5. Ведущий признак типичной формы инфаркта миокарда:
1. Полиурия
2. **Сжимающий характер боли за грудиной**
3. Гипертензионный синдром
4. Гипогликемия

6. Медицинские термометры после дезинфекции хранятся в:
1. 70% спирте
2. **Сухом виде**
3. Дистиллированной воде
4. Дез. растворе

7. Для согревающего компресса используют спирт:
1. 30%
2. **45%**
3. 70%

4. 95%

8. Под действием адреналина тонус сосудов:
1. **Увеличивается**
2. Уменьшается
3. Не изменяется
4. Адреналин не влияет на тонус сосудов

9. Критерий эффективности проведения реанимационных мероприятий:
1. Повышение температуры тела
2. Появление сознания
3. **Появление пульса на сонной артерии**
4. Повышение АД

10. Шок –это:
1. Острая сердечная недостаточность
2. **Острая сосудистая недостаточность**
3. Острая дыхательная недостаточность
4. Нарушение мозгового Кровообращения

11. Острая сосудистая недостаточность характеризуется:
1. Внезапным подъемом давления
2. Внезапным падением давления
3. **Болями за грудиной**
4. Головокружением

12. Положение больного на животе:
1. На правом боку
2. На левом боку
3. **Колено – локтевое**

13. Мокрота собирается в течение 1-3 суток для:
1. Исследование на атипические клетки
2. **Исследование на наличие микобактерий туберкулеза**
3. Посева мокроты для выявления ее микрофлоры
4. Исследования на наличие крови

14. При заборе крови из вены процедурная медсестра должна менять перчатки:
1. **После каждого больного**
2. После 5 больных
3. После окончания работы
4. При нарушении целостности перчаток

15. Полное прекращение выделения мочи обозначается:

1. **Анурия**
2. Олигурия
3. Полиурия
4. Атония

16. При гипогликемической коме кожные покровы:
1. Сухие, горячие на ощупь
2. **Бледные, холодный липкий пот**
3. Сухие, холодные на ощупь
4. Бледные, горячие на ощупь

17. К ранним симптомам биологической смерти относятся:
1. Широкие зрачки
2. Трупное окоченение
3. Трупные пятна
4. **Помутнение роговицы**

18. При брадикардии число сердечных сокращений:
1. Менее 70 в минуту
2. **Менее 60 в минуту**
3. Более 80 в минуту
4. 70 в минуту

19. Пути передачи гепатита В:
1. Воздушно - капельный
2. **Парентеральный и половой**
3. Алиментарный
4. Контактный

20. В питании больных гипертонической болезнью следует ограничить:
1. Растительные жиры
2. **Поваренную соль**
3. Жаренную пищу
4. Углеводы

21. Спирт является:
1. Стерилизующим препаратом
2. **Дезинфицирующим препаратом**
3. Антисептиком
4. Фунгицидом

22. Анафилактический шок- это острая недостаточность:
1. Сердечная
2. Почечная
3. **Сосудистая**

4. Дыхательная

23. Скопление жидкости в плевральной полости называется:
1. Асцит
2. Анасарка
3. Пневмоторакс
4. **Гидроторакс**

24. Признак передозировки гепарина:
1. **Гематурия**
2. Гипотония
3. Никтурия
4. Полиурия

25. Положительная реакция на наличие скрытой крови при азопирамовой пробе:
1. Бурое окрашивание
2. Розовое окрашивание
3. **Сиренево - фиолетовое окрашивание**
4. Зеленоватое окрашивание

26. Стерилизация медицинского инструментария предполагает уничтожение:
1. **Всех форм патогенных и непатогенных микроорганизмов**
2. Только спор бактерий
3. Только вирусов
4. Возбудителей болезни передающейся только парентеральным путем

27. Признак желудочного кровотечения:
1. Прогрессивное падение давления
2. **Рвота «кофейной гущей»**
3. Консистенция кала «малиновое желе»
4. Снижение гемоглобина крови

28. Пути передачи гепатита А:
1. Половой
2. Парентеральный
3. **Фекально - оральный**
4. Трансмиссивный

29. Повторный осмотр на педикулез проводится:
1. Ежедневно
2. **Через 10 дней**
3. При выписке пациента
4. Через неделю

30. При электротравме оказание помощи должно начинаться:
1. С непрямого массажа сердца
2. С ИВЛ
3. С прекардиального удара
4**. С прекращения воздействия тока**

31. Сердечно – легочная реанимация продолжается:
1. 5 минут
2. 15 минут
3. **30 минут**
4. До 1часа

32. Масляные растворы нельзя вводить:
1. **Внутривенно**
2. Внутримышечно
3. Подкожно
4. Ректально

33. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении, кровохарканье:
1. **Придать полусидячее положение, обеспечить голосовой покой**
2. Наложение жгутов на обе руки
3. Введение антикоагулянтов
4. Ведение дезагрегантов

34. Методами дезинфекции мед. инструментария являются:
1. Химические
2. **Физические и химические**
3. Физические
4. Биологические

35. Проба по- Зимницкому проводится для определения:
1. **Соотношение дневного и ночного диуреза**
2. Лейкоцитурии
3. Бактериурии
4. Глюкозурии

36. Передозировка инсулина может вызвать:
1. **Гипогликемическую кому**
2. Кетоацидотическую кому
3. Гиперсмолярную кому
4. Лактацидемическую кому

37. Норма гемоглобина для мужчин:
1. 90-100 г/л
2. 100-110 г/л
3. 120-140 г/л
4. **130-160 г/л**

38. Для постановки горчичников используется вода температурой:
1. 35-38 гр.
2. **40-45 гр.**
3. 30-35 гр.
4. 50 гр.

39. Манжетка монометра накладывается на обнаженную руку:
1. **На 2-3 см выше локтевого сгиба**
2. Не имеет значения
3. На 5 см выше локтевого сгиба
4. На локтевой сгиб

40. Независимое сестринское вмешательство при гипертензивном кризе:
1. Инъекции дибазола в/м
2. Рекомендации по приему гипотензивных средств
3. **Измерение АД**
4. Проведение ЭКГ

41. Температура воды в грелке:
1. **60 гр.**
2. 40-45 гр.
3. 80 гр.
4. 100 гр.

42.Появление на плечевой артерии первых звуков соответствует:
1. **Систолическому давлению**
2. Пульсовому давлению
3. Диастолическому давлению

43.Одной из важнейших задач сестринского процесса является:
1. Диагноз заболевания
2. Назначение лечения
3. Уточнение причины заболевания
4. **Профессиональный уход с учетом медико – санитарных потребностей пациента**

44. При подготовке больного к операции операционное поле бреется:
1. За один день до операции
2. В ночь перед операцией

3. Не имеет значения
4. **Непосредственно перед операцией**

45. По наполнению пуль различают:
1. Ритмичный, аритмичный
2. Скорый, медленный
3. **Полный, нитевидный**
4. Твердый, мягкий

46. Акроцианоз- это синюшность:
1. Губ
2. Губ и кончика носа
3. Губ, кончика носа, пальцев рук и ног
4. **Губ, кончика носа, пальцев рук и ног, ушных раковин**

47. Место постановки ВК пробы:
1. Наружная поверхность бедра
2. Верхний наружный квадрант ягодицы
3. Под лопатку
4. **Средняя треть внутренней поверхности предплечья**

48. Наиболее важный момент подготовки к сбору общего анализа мочи:
1. Анализ собирается натощак
2. **Гигиеническая подготовка пациента**
3. Чистая посуда
4. Стерильная посуда

49. Приоритетная проблема пациента во время приступа бронхиальной астмы:
1. **Удушье**
2. Слабость
3. Повышенная температура
4. Головная боль

50. Ингаляционные препараты для снятия приступа бронхиальной астмы:
1. Ингалипта
2. Каметона
3. **Беротека**
4. **Сальбутамола**

51. Причины, вызывающие приступ почечной колики:
1. Переохлаждение
2. **Физическое напряжение и обильный прием жидкости**
3. Изменение климата
4. Обильный прием жидкости

52. При пиелонефритах питьевой режим:
1. Ограниченный
2. Обычный
3. **Усиленный**
4. Не имеет значение

53. Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто связана с:
1. Острый гломерулонефрит
2. Острый пиелонефрит
3. Острый цистит
4. **Аденома предстательной железы**

54. Специальное учреждение, в котором оказывается паллиативная помощь:
1. Поликлиника
2. Стационар
3. **Хоспис**
4. Диспансер

55. Пиридоксин, это витамин:
1. А
2. Е
3. В1
4. **В6**

56. Витамин В 12 называется:
1. Рибофлавином
2. Пиридоксином
3. **Цианокобаламином**
4. Фолиевой кислотой

57. Для профилактики туберкулеза население проходит обязательное флюорографическое исследование:
1. **1 раз в год**
2. 1 раз в 2 года
3. 1 раз в смену
4. 2 раза в год

58. Основной функциональной обязанностью палатной медсестры стационара является:
1. **Непосредственный уход за больными**
2. Контроль выполнения врачебных назначений
3. Контроль расстановки медицинского персонала

4. Организация своевременной выписки, учета, распределения и хранения медикаментов и материалов

59. Все виды инструктажей на рабочем месте со средним медперсоналом проводит:
1. Главный врач
2. **Заведующий отделением**
3. Инженер по охране труда
3. Главная медсестра

60. Палатная санитарка обязана проводить влажную уборку палат не реже:
1. 1 раз утром
2. **2 раза утром и вечером**
3. 3 раз
4. Как получится

61. Мышечная сила определяется методом:
1. Антропометрией
2. **Динамометрией**
3. Спирометрией
4. Тонометрией

62. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослых в норме:
1. 100 -120
2. 90 - 100
3. **60 - 90**
4. 40 – 60

63. Пульс 50 ударов в 1 минуту, это:
1. Норма
2. **Брадикардия**
3. Тахикардия
4. Экстрасистолия

64. Нормальное артериальное давление- это давление:
1. Меньше 110/ 70 мм рт. ст.
2**. Меньше 130/ 85 мм рт. ст.**
3. Больше 130/ 85 мм рт. ст.
4. Больше 140/ 90 мм рт. ст.

65. Вскрытая ампула с туберкулином сохраняется:
1. 1 час
2. **2 часа**
3. 4 часа
4. 6 часов

66.Увеличение частоты дыхания называется:
1. Апноэ
2. Диспноэ
3. Гиперпноэ
4. **Тахипноэ**

67. Сахарный диабет развивается при заболевании:
1. Печени
2. Сердца
3. **Поджелудочной железы**
4. Щитовидной железы

68. Скопление жидкости в брюшной полости – это:
1. Анасарка
2. Гидроторакс
3. **Асцит**
4. Гидроперикард

69. Распространенные отеки подкожной клетчатки по всему телу – это:
1. Асцит
2. Гидроперикард
3. Гидроторакс
4. **Анасарка**

70. Медсестра может определить наличие отеков у пациента на ногах методом:
1. Взвешивания
2. **Пальпации**
3. Измерение суточного диуреза
4. Аускультации

71. Плевральную пункцию проводят с целью:
1. Разъединения плевральных сращений
2. Отсасывания мокроты из бронхов
3. Уменьшения болевого синдрома
4. **Удаления жидкости из плевральной полости**

72. Взятие крови на биохимическое исследование проводится:
1. Через 15 мен. после приема пищи
2. **Строго натощак**
3. Независимо от приема пищи
4. Через 2 часа после приема пищи

73. Суточный диурез измеряется для определения:

1. Концентрационной функции
2. Патологических элементов в моче
3. **Выделительной функции**
4. Общего анализа мочи

74. Для определения суточного диуреза необходима емкость объемом:
1. 2 литр
2. 2 литра
3. **3 литра**
4. 4 литра

75. Нормальный уровень сахара в крови:
1. 3,3- 4,4 ммоль/л
2. 4,0- 6,6 ммоль/л
3. **3,3- 5,5 ммоль/л**
4. 5,5- 7,7 ммоль/л

76. Ирригоскопия – это исследование:
1. Эндоскопическое
2. **Рентгенологическое**
3. Радиоизотопное
4. Биохимеческое

77. При ирригоскопияи исследуемый орган:
1. Желудок
2. Желчный пузырь
3. **Толстый кишечник**
4. Тонкий кишечник

78. При правильно проведенной пробе манту на месте введения появляется:
1. **Лимонная корочка**
2. Отек кожи
3. Гиперемия
4. Кровь

79. Дуоденальное зондирование проводится:
1. После завтрака
2. **Натощак**
3. После обеда
4. После ужина

80. Переаттестация на подтверждение квалификационной категории проводится каждые:

1. 2 года
2. 3 года
3. **5 лет**
4. 7 лет

81. Колоноскопия- это исследование:
1. **Эндоскопическое**
2. Рентгенологическое
3. Радиоизотопное
4. Биохимическое

82. ЭКГ – это запись:
1. Функциональных шумов сердца
2. **Электрических колебаний, возникающих в сердце**
3. Ультразвуковых волн
4. Тонов сердца

83. Срок хранения стерильности изделий на стерильном столе:
1**. 6 часов**
2. 3 суток
3. 7 дней
4. до 1 суток

84. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на инструментарии и белье достигается при:
1. Дезинфекции
2. Предстерилизационной очистки
3. **Стерилизации**
4. Дератизации

85. При проведении катетеризации мочевого пузыря медсестра использует перчатки:
1. **Хирургический**
2. Гигиенический
3. Обычное мытье
4. Двойное мытье

86. Профилактические медицинские осмотры являются основой:
1. Первичной медико – санитарной помощи
2. **Диспансеризации**
3. Реабилитации
4. Экспертизы трудоспособности

87. Состояние пациента при гипертонической болезни, требующее срочной помощи:

1. Боль
2. Тошнота
3. Рвота
4. **Гипертензивный криз**

88. Характеристики пульса при гипертензивном кризе:
1. Слабого наполнения и напряжения, ритмичный
2. **Напряжен, удовлетворительного наполнения, ритмичный**
3. Нитевидный, аритмичный
4. Хорошего наполнения, напряжения

89. Азопирамовая проба проводится для определения остатков:
1. Хлора
2. **Крови**
3. Моющего средства
4. Жира

90. Типичная клиническая форма инфаркта миокарда:
1. Асматическая
2. Абдоминальная
3**. Болевая**
4. Церебральная

91. Артериальное давление при остром инфаркте миокарда:
1. Нормальное
2. **Понижено**
3. Незначительно повышено
4. Значительно повышено

92. Санитарно – курортное лечение показано в период заболевания:
1. Острый
2. Хронический
3. **Ремиссии**
4. Обострения

93. Асептика – это:
1**. Уничтожение инфекции на поверхности предметов**
2. Уничтожение инфекции в ране, организме больного
3. Предупреждение попадания инфекции
4. Наука о инфекциях заболеваниях

94. Клинические проявления крапивницы:
1. Кожный зуд
2. Отек век
3. **Сыпь на коже**

4. Удушье

95. Дренажные положения необходимо принимать для:
1. Улучшения кровообращения
2. Уменьшения кашля
3. **Лучшего отхождения мокроты**
4. Уменьшения отхождения мокроты

96. Симптомы отека Квинке:
1. Боль за грудиной
2. Кожный зуд
3. **Отек губ, век, носа**
4. Падение артериального давления

97. Бронхиты относятся к заболеваниям:
1. Наследственным
2. Предраковым
3. **Воспалительным**
4. Обменным

98. Симптомы общей интоксикации при бронхитах:
1. Отсутствуют
2. **Умеренно выражены**
3. Ярко выражены
4. Часто приводит к агональным состояниям

99. Приоритетная физиологическая проблема пациента с острым бронхитом:
1. Слабость
2. Лихорадка
3. **Кашель с мокротой**
4. Потливость

100. Независимое вмешательство медсестры при уходе за пациентом:
1. Введение антибиотиков
2. **Обеспечение плевательницей**
3. Постановка банок
4. Сбор мокроты на исследование

Профессиональная переподготовка
по специальности «Сестринское дело»
Ответы на тесты

1.	**2**	**26.**	**1**	**51.**	**2**	**76.**	**2**
2.	**4**	**27.**	**2**	**52.**	**3**	**77.**	**3**
3.	**2**	**28.**	**3**	**53.**	**4**	**78.**	**1**
4.	**1**	**29.**	**2**	**54.**	**3**	**79.**	**2**
5.	**2**	**30.**	**4**	**55.**	**4**	**80.**	**3**
6.	**2**	**31.**	**3**	**56.**	**3**	**81.**	**1**
7.	**2**	**32.**	**1**	**57.**	**1**	**82.**	**2**
8.	**1**	**33.**	**1**	**58.**	**1**	**83.**	**1**
9.	**3**	**34.**	**2**	**59.**	**2**	**84.**	**3**
10.	**2**	**35.**	**1**	**60.**	**2**	**85.**	**1**
11.	**3**	**36.**	**1**	**61.**	**2**	**86.**	**2**
12.	**3**	**37.**	**4**	**62.**	**3**	**87.**	**4**
13.	**2**	**38.**	**2**	**63.**	**2**	**88.**	**2**
14.	**1**	**39.**	**1**	**64.**	**2**	**89.**	**2**
15.	**1**	**40.**	**3**	**65.**	**2**	**90.**	**3**
16.	**2**	**41.**	**1**	**66.**	**4**	**91.**	**2**
17.	**4**	**42.**	**1**	**67.**	**3**	**92.**	**3**
18.	**2**	**43.**	**4**	**68.**	**3**	**93.**	**1**
19.	**2**	**44.**	**4**	**69.**	**4**	**94.**	**3**
20.	**2**	**45.**	**3**	**70.**	**2**	**95.**	**3**
21.	**2**	**46.**	**4**	**71.**	**4**	**96.**	**3**
22.	**3**	**47.**	**4**	**72.**	**2**	**97.**	**3**
23.	**4**	**48.**	**2**	**73.**	**3**	**98.**	**2**
24.	**1**	**49.**	**1**	**74.**	**3**	**99.**	**3**
25.	**3**	**50.**	**3,4**	**75.**	**3**	**100.**	**2**