ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО»
ТЕСТЫ

1. Кровь для переливания необходимо достать из холодильника за:
1. 15-30 минут
2. 30-60 минут
3. 60-90 минут
4. 90-120 минут

2. В экстренных ситуациях кровь для переливания подогревают в воде, температура которой не превышает:
1. 37-38 градусов С
2. 38-40 градусов С
3. 38-42 градуса С
4. 42-44 градуса С

3. После переливания крови медсестра следит за:
1. Пульсом
2. Пульсом и АД
3. Пульсом, АД и диурезом

4. Кровезаменитель противошокового действия:
1. Гемодез
2. Полиглюкин
3. Раствор Рингера
4. Аминокровин

5. Компонент крови, обладающий наиболее выраженным гемостатическим эффектом:
1. Лейкоцитарная масса
2. Плазма
3. Альбумин
4. Протеин

6. При проведении биологической пробы необходимо:
1. Ввести капельно троекратно 25 мл крови
2. Ввести струйно 15 мл и наблюдать 3 минуты
3. Ввести струйно трижды 15-25 мл с интервалом 5 минут
4. Ввести струйно трижды 15-25 мл с интервалом 3 минуты

7. Какое осложнение можно предположить , если у больного во время переливания крови появилась боль в пояснице:
1. Цитратный шок
2. Анафилактический шок
3. Гемотрансфузионный шок
4. Воздушная эмболия

8. Раствор для дезинфекции игл после определения группы крови:
1. 0,5% раствор осветленной хлорной извести
2. 1% раствор хлорамина
3. 3% раствор хлорамина
4. 0.5% раствор СМС

9. Венозное кровотечение останавливают наложением:
1. Жгута
2. Лейкопластырной повязкой
3. Смазыванием раствором йода
4. Давящей повязки

10. При артериальном кровотечении жгут накладывают не более чем на:
1. 30 минут
2. 60 минут
3. 120 минут
4. 180 минут

11. Уборку операционного блока производят в течение дня:
1. 1 раз
2. 2 раза
3. ни разу
4. по требованию, но не реже 2-х раз

12. Обезжиривание шелка в эфире продолжается часов:
1. 6-12
2. 12-24
3. 24-36
4. 6-48

13. Шелк хранят в спирте, который меняют каждые:
1. 2 дня
2. 5 дней
3. 10 дней
4. 20 дней

14. При асфиксии кровь:
1. Темнеет
2. Светлеет
3. Цвет не изменяет

15. Зон загрязнения в операционном блоке:
1. 1
2. 3
3. 2

16. Температура в операционной должна быть:
1. 18 градусов
2. 20 градусов
3. 24 градуса
4. 10-12 градусов

17. Влажность в операционной:
1. 100%
2. 50-60%
3. 20%

18. Генеральная уборка в операционной делается:
1. 1 раз в неделю
2. 1 раз в месяц

19. Текущая уборка в операционной проводится:
1. 1 раз в день
2. в течение всего рабочего дня

20. Ваши действия при входе в стерильную зону:
1. Одеть халат, перчатки и открыть стерильные укладки
2. Одеть халат, открыть укладки с инструментами, одеть перчатки
3. Одеть перчатки, открыть укладки, одеть халат

21. Время для подготовки кожи пациента:
1. 1 минута
2. Столько же сколько готовят руки перед операцией - 5 мин

22. Инструменты для стерилизации в автоклаве закладываются в укладки:
1. С открытыми брантами
2. С закрытыми брантами

23. Операционную делят на зоны:
1. Стерильную, чистую, для снятия грязного белья
2. Стерильную и чистую
3. Стерильную и для снятия грязного белья

24. Вести счет инструментов, салфеток и игл необходимо:
1. 3 раза: до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции
2. После операции
3. До и после операции

25. В оперблоке покрытие для стен лучше:
1. Кафель
2. Мрамор
3. Клеенка

26. Операционная медсестра может дотрагиваться до стерильных объектов:
1. Руками в стерильных перчатках
2. Руками, обработанными одним из методов обработки рук
3. Все ответы верны

27. Во время операции операционная медсестра:
1. Может касаться рук хирурга
2. Не может касаться рук хирурга
3. Может, при необходимости

28. Инструменты, бывшие в употреблении и предназначенные для повторного применения:
1. Размещены отдельно от незадействованных
2. Могут быть размещены вместе с незадействованными
3. Кладут на отдельный столик

29. Инструменты после вскрытия полых органов:
1. Сбрасываются хирургом
2. Сбрасываются медсестрой
3. Сбрасываются санитаркой

30. На большом операционном столе инструменты располагаются от края:
1. 5 см
2. 10 см
3. 20 см

31. На малом операционном столике в карманах можно располагать перевязочный материал для всех видов операции кроме:
1. Торракальных
2. Глазных
3. Абдоминальных
4. Гинекологических

32. Хирургическая инфекция может проникать в рану:
1. Экзогенным путем
2. Эндогенным путем
3. Все ответы верны

33. Пути распространения эндогенной инфекции все, кроме:
1. Гематогенного
2. Лимфогенного
3. Контактного
4. Воздушного

34. К инструментам для разделения тканей относятся все, кроме:
1. Ножниц
2. Иглодержателя
3. Скальпеля
4. Кусачек Люэра

35. К захватывающим инструментам относятся все кроме:
1. Цапки
2. Пинцета анатомического
3. Крючка Фарабефа
4. Кусачек Листона

36. Полное удаление органа:
1. Резекция
2. Экстракция
3. Экстирпация

37. Предварительную уборку операционной производят с применением:
1. Дезсредства
2. Воды
3. Сухим способом

38. В оперблоке посевы воздуха производят:
1. 4 раза в месяц
2. 1 раз в месяц
3. 1 раз в 3 месяца

39. Частота смены маски:
1. Каждые 6 часов
2. Перед каждой операцией
3. Каждые 4 часа

40. Способ подачи инструментов операционной сестрой хирургу:
1. Непосредственно в руки
2. Выкладывая их на столик
3. Комбинация этих способов
4. Все ответы верны

41. Анестезия должна быть завершена к моменту:
1. Наложения швов на кожу
2. Началу послойного ушивания раны
3. Через час после операции

42. Кровотечение сильнее при:
1. Резаных и рубленых ранах
2. Рваных и ушибленных ранах

43. Операционная медсестра подает зажимы:
1. Защелкнутыми
2. Не защелкнутыми

44. Ножницы подаются хирургу:
1. В закрытом виде ручками к руке хирурга
2. В открытом виде браншами к руке хирурга
3. В открытом виде ручками к руке хирурга
4. В закрытом виде браншами к руке хирурга

45. Мультифиламентный шовный материал:
1. Одна нить
2. Множество перекрученных нитей

46. Меньше реакция тканей на:
1. Шелк
2. Кетгут
3. Нейлон

47. Бесшовное закрытие ран осуществляется:
1. Кожными скобами
2. Кожным пластырем
3. Все ответы верны

48. Длительно заживающие ткани должны быть сшиты:
1. Рассасывающимся материалом
2. Нерассасывающимся материалом

49. Для получения лучшего косметического эффекта использовать все, кроме:
1. Мультифиламентного материала
2. Кожного пластыря

50. Фасцию зашивают:
1. Нерассасывающейся нитью и режущей иглой
2. Рассасывающейся нитью и колющей иглой
3. Нерассасывающейся нитью и колющей иглой
4. Рассасывающейся нитью и режущей иглой

51. Повязка на рану обеспечивает все, кроме:
1. Оптимальной физической среды
2. Свободного газообмена
3. Бактериального барьера
4. Остановки кровотечения

52. К химическим методам остановки кровотечения относятся все, кроме:
1. Нитрата серебра
2. Адреналина
3. Тромбина
4. Аспирина

53. К позиции пациента на спине руки на подлокотниках расположены под углом к телу:
1. 90 градусов ладонями вверх
2. Менее 90 градусов ладонями вверх
3. Менее 90 градусов ладонями вниз

54. Основных позиций пациента на операционном столе:
1. 4
2. 5
3. 3
4. 6

55. Хирургия - это:
1. раздел медицины, изучающий травмы, при которых применяется оперативное лечение
2. раздел медицины, изучающий болезни и травмы, при которых применяется оперативное лечение

56. К осложнениям кровотечений относятся:
1. острая анемия
2. геморрагический шок
3. сдавление органов и тканей излившейся кровью
4. воздушные эмболии
5. коагулопатические осложнения
6. все ответы верны

57. Для ингаляционного наркоза используют:
1. фторотан
2. закись азота
3. трилен
4. эфир
5. все ответы верны

58. Для внутривенного наркоза применяют:
1. гексенал
2. этаминал натрия
3. колипсол
4. эфир
5. все, кроме колипсол
6. все, кроме эфира

59. К местноанестезирующим средствам относятся:
1. новокаин
2. лидокаин
3. тримекаин
4. дикаин
5. совкаин
6. гексенал
7. все, кроме гексенала
8. все, кроме совкаина

60.Десмургия - это:
1. наука о перевязочных материалах
2. наука, изучающая виды повязок, цели и способы их наложения

61. Назовите основные признаки переломов:
1. факт травмы
2. хруст в месте повреждения
3. сильная боль
4. нарушение функций и деформация конечности (искривление или укорочение)
5. все перечисленные признаки

62. Активная первичная хирургическая обработка включает:
1. удаление попавших в рану микроорганизмов путем иссечения ее краев или рассечения тканей
2. удаление всех поврежденных тканей, сгустков крови
3. перевод всех видов ран в резаные для ускорения процессов регенерации
4. тщательный полный и окончательный гемостаз
5. восстановление анатомической целостности поврежденных тканей путем наложения швов, при необходимости дренирования раны
6. все верно

63. Чаще всего встречаются ожоги:
1. электрические
2. термические
3. лучевые
4. химические

64. Фурункул - это:
1. воспаление подкожной жировой клетчатки
2. гнойно-некротическое воспаление волосяной луковицы и окружающей ткани
3. гнойное воспаление апокриновых потовых желез
4. ограниченная форма гнойного воспаления слюнных желез

65. Карбункул - это:
1. гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных луковиц и прилегающих к ним сальных желез, распространяющееся на всю толщу кожи и подлежащие ткани
2. гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных луковиц
3. ограниченная форма гнойного воспаления, для которого характерно образование полости, заполненное гноем
4. гнойное воспаление апокриновых потовых желез

66. Флегмона - это:
1. ограниченная форма гнойного воспаления
2. острое неограниченное, разлитое воспаление клетчаточных пространств
3. гнойное воспаление сустава
4. воспаление стенки вены

67. При подозрении на развитие газовой гангрены необходимо:
1. широкое вскрытие всех подозрительных участков
2. рана должна быть открыта
3. введение в края и в дно раны антибиотиков широкого спектра действия
4. проведение интенсивной инфузионной терапии
5. введение противогангренозных сывороток
6. все ответы верны
7. все не верно

68. Для злокачественных опухолей характерно:
1. быстрый рост с инфильтрацией тканей и метастазами
2. медленный рост
3. отсутствие метастазов

69. Терапия злокачественных опухолей включает:
1. хирургическое лечение
2. лучевое
3. химиотерапевтическое
4. все ответы верны

70. Основным методом диагностики рака желудка является:
1. рентгеноскопия желудка
2. УЗИ
3. фиброгастроскопия

71. Клиническая картина при прободной язве желудка и 12-типерстной кишки:
1. внезапная "кинжальная" боль в эпигастральной области
2. бледность кожных покровов, холодный пот
3. пульс слабый
4. низкое артериальное давление
5. все ответы верны

72. Шина Кремера применяется чаще для иммобилизации:
1. верхних конечностей
2. нижних конечностей
3. шеи
4. позвоночника

73. К осложнениям варикозного расширения вен относятся:
1. тромбофлебит
2. разрыв венозных узлов
3. переломы

74.Опасным осложнением ущемленной пахово-мошоночной грыжи является:
1. Отек яичка
2. Отек мошонки
3. Нагноение яичка
4. Острая задержка мочи
5. Острая кишечная непроходимость

75. Ведущим симптомом острой кишечной непроходимости является:
1. Острая "кинжальная " боль в животе
2. Ноющая боль в животе
3. Схваткообразные боли в животе
4. Частый жидкий стул

76. Ведущим симптомом почечной колики является:
1. Резь при мочеиспускании
2. Ноющие боли в пояснице
3. Частое мочеиспускание
4. Высокая температура
5. Приступнообразные острые боли

77. Отек правой нижней конечности может развиться на фоне острого аппендицита вследствие:
1. Тромбоза подвздошных вен
2. Распространения воспалительного процесса на бедро
3. Вовлечения в воспалительный процесс подвздошно поясничной мышцы

78. Клиника острой кровопотери развивается даже при кровопотере, равной:
1. 250 мл.
2. 500 мл.
3. 1000 мл.
4.1500мл.
5.2000мл.

79. Вливание 1 литра физиологического раствора хлористого натрия увеличивает объем циркулирующей крови:
1. На 1000 мл.
2. На 750 мл.
3. На 500 мл.
4. На 250 мл.
5. Меньше 250 мл.

80. Объем циркулирующей крови у взрослых мужчин составляет:
1. 50 мл/кг
2. 60 мл/кг
3. 70 мл/кг
4. 80 мл/кг
5. 90 мл/кг

81. Лечение острой кровопотери начинают с переливания:
1. Эритроцитарной массы
2. Донорской крови
3. Кристаллоидных растворов
4. Коллоидных растворов

82. Факторами свидетельствующими о ранении сердца являются:
1. Резкое снижение АД и тахикардия
2. Внешний вид больного
3. Брадикардия и снижение АД

83. Симптомами характерными для тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей являются:
1. Распирающие боли
2. Повышение температуры
3. Гиперемия кожи и отек по ходу вен и дистальные отеки
4. Резкая боль при пальпации

84. Ранним симптомом начавшегося желудочного кровотечения является:
1. Мелена
2. Напряжение мышц передней брюшной стенки
3. Рвота желудочным содержимым цвета "кофейной гущи"
4. Брадикардия
5. Коллапс

85. Наиболее частой причиной возникновения острого панкреатита у женщин является:
1. Беременность
2. Хронический холецистит
3. Алкоголизм
4. Травма живота
5. Применение кортикостероидов

86. Наиболее частой причиной острого панкреатита у мужчин является:
1. Травма живота
2. Применение кортикостероидов
3. Алкоголизм
4. Хронический холецистит
5. Цирроз печени

87. Ожоговый шок у лиц средней возрастной группы, не имеющих отягощающих факторов, развивается при глубоких ожогах площадью:
1. 5% поверхности тела
2. 10% поверхности тела
3. 15% поверхности тела
4. Более 20% поверхности тела
5. Более 30% поверхности тела

88. Крипторхизм - аномалия внутриутробного развития, при котором к моменту рождения плода:
1. одно или оба яичка опустились из забрюшинного пространства через паховый канал в мошонку
2. недоразвито одно яичко
3. недоразвиты оба яичка

89. При подозрении на острый живот медсестре необходимо:
1. Ввести анальгетики
2. Тепло на живот
3. Сделать очистительную клизму
4. Холод на живот, вызвать скорую помощь

90. Правила транспортировки больного с синдромом "острый живот":
1. Лежа на носилках
2. Сидячее положение
3. Полусидячее положение

91 . Артериальным кровотечением является:
1. Пульсирующее кровотечение ярко-красного цвета
2. Кровотечение струей, темно-вишневого цвета
3. Истечение крови из мельчайших кровеносных сосудов

92. Положение больного с носовым кровотечением:
1. Сидя, запрокинув голову
2. Горизонтальное положение на спине
3. Сидя, слегка опустив голову

93. При ожогах II степени (небольшие, ненапряженные пузыри со светлым содержимым, гиперемия вокруг пузырей) необходимо:
1. Смазать обожженную поверхность мазью
2. Вскрыть пузыри
3. Наложить асептическую повязку

94. Неотложная помощь при отморожениях II степени:
1. Вскрыть пузыри
2. Наложить асептическую повязку
3. Наложить теплоизолирующую повязку
4.Растирать отмороженную часть снегом

95. Транспортная иммобилизация при повреждениях таза:
1. На животе
2. На щите
3. В положении «лягушки»

96. При ожогах кисти накладывается повязка:
1. Колосовидная
2. Спиральная
3. Возвращающаяся повязка на кисть - "варежка"

97. Максимальное время наложение жгута зимой:
1. 1 час
2. 30 минут
3. 2 часа
4. 15 минут

98. Пузырь со льдом ставят при:
1. ушибах на пятые сутки
2. ушибах в первые сутки.
3. бронхиальной астме
4. ожогах

99. Наиболее частые осложнения острого инфаркта миокарда в остром периоде:
1. кардиогенный шок
2. отек легких
3. нарушение ритма сердца
4. все перечисленное

100. Осложнениями у больного крупозной пневмонией могут быть:
1. инфекционно-токсический шок
2. коллапс
3. отек легкого
4. острая дыхательная недостаточность
5. все вышеперечисленное
6. правильные ответы 3, 4.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО»

1.	**3**	26.	**1**	51.	**4**	76.	**5**
2.	**1**	27.	**2**	52.	**4**	77.	**1**
3.	**3**	28.	**1**	53.	**2**	78.	**3**
4.	**2**	29.	**1**	54.	**2**	79.	**5**
5.	**2**	30.	**2**	55.	**2**	80.	**3**
6.	**4**	31.	**2**	56.	**6**	81.	**3**
7.	**3**	32.	**3**	57.	**5**	82.	**3**
8.	**3**	33.	**4**	58.	**6**	83.	**3**
9.	**4**	34.	**2**	59.	**7**	84.	**3**
10.	**2**	35.	**4**	60.	**2**	85.	**2**
11.	**4**	36.	**3**	61.	**5**	86.	**3**
12.	**2**	37.	**1**	62.	**6**	87.	**2**
13.	**3**	38.	**2**	63.	**2**	88.	**1**
14.	**1**	39.	**2**	64.	**1**	89.	**4**
15.	**2**	40.	**4**	65.	**1**	90.	**1**
16.	**3**	41.	**1**	66.	**2**	91.	**1**
17.	**2**	42.	**1**	67.	**6**	92.	**3**
18.	**1**	43.	**2**	68.	**1**	93.	**3**
19.	**2**	44.	**1**	69.	**4**	94.	**3**
20.	**1**	45.	**2**	70.	**3**	95.	**3**
21.	**2**	46.	**3**	71.	**5**	96.	**3**
22.	**1**	47.	**3**	72.	**1**	97.	**2**
23.	**1**	48.	**2**	73.	**2**	98.	**2**
24.	**1**	49.	**2**	74.	**5**	99.	**4**
25.	**2**	50.	**1**	75.	**3**	100.	**5**